




**GAMA BIOSEGURIDAD
FAMILIA INSQUIM**

CYP 10 PLUS EICON® EC

INSECTICIDA-ACARICIDA

Concentrado emulsionable de amplio espectro para instalaciones ganaderas.

Eficaz frente a ácaro rojo, escarabajo de la cama, garrapatas, moscas, mosquitos y pulgas. Actúa por contacto e ingestión con marcado efecto de choque y buena persistencia.

CARACTERÍSTICAS

CYP 10 PLUS EICON® EC es un insecticida piretroide concentrado emulsionable, que proporciona un alto poder de desalojo, volteo y muerte. Actúa por contacto e ingestión sobre insectos y ácaros del entorno ganadero (moscas, mosquitos, pulgas, garrapatas, escarabajo del estiércol, ácaro rojo). No huele, insecticida indicado para infestaciones graves que requieren de un tratamiento de choque rápido y efectivo.

COMPOSICIÓN

Cipermetrina 9,3%, Butóxido de piperonilo 1%, Geraniol 0,15%.

INDICACIONES

Insecticida-acaricida de uso en el entorno ganadero indicado para la desinsectación de todo tipo de instalaciones avícolas, de porcino, rumiantes, cunícolas, etc., así como perreras, zoológicos y otros recintos donde habiten y/o coexistan animales del entorno ganadero, excepto aquellos lugares destinados a tratamientos externos de transformación de productos de origen animal y de sus envases, así como los destinados al tratamiento de locales, instalaciones o maquinaria relacionada con la industria alimentaria. CYP 10 PLUS EICON® EC se utiliza para el control de moscas, mosquitos, coleópteros (*Alphitobius diaperinus*), pulgas, ácaros (*Dermanyssus gallinae*), y garrapatas.

MODO DE APLICACIÓN Y DOSIS:

AGITAR ANTES DE USAR. Antes de aplicar el producto debe realizarse una limpieza previa de la superficie a desinsectar, se obtendrá una mejor fijación del producto y aumentará su persistencia. Aplicar mediante pulverización, nebulización o termonebulización en las zonas de paso de los insectos y arácnidos, como suelos, paredes, techos, zócalos, ventanas, separaciones, y donde éstos se posan, habitan o se esconden, como rendijas y hendiduras. La mezcla no deberá ser utilizada una vez transcurridas 24 horas desde su preparación.

- **Dosis para pulverización:** 10 ml/1 L de agua para 10-20 m².
- **Dosis para nebulización y termonebulización:** diluir 100 ml en 1 L de agua para tratar 500 m³. Estas aplicaciones quedan reservadas exclusivamente para uso por personal especializado.

REGISTRO

Reg.Of.P.Zoosanitario: 11990-P.

Autorizado para uso en el entorno ganadero.

USOS AUTORIZADOS

Uso por personal no profesional.
Uso por personal profesional.
Uso por personal especializado.



PLAZO DE SEGURIDAD

Uso por personal profesional: Aplicar el tratamiento en ausencia de animales, respetando un plazo de seguridad de 6 h para aplicación por pulverización y, posteriormente, asegurar una adecuada ventilación antes del realojo de los animales.

Uso por personal especializado: Aplicar el tratamiento en ausencia de animales, respetando los plazos de seguridad de 6 h para pulverización y 12 horas para nebulización o termonebulización, posteriormente asegurar una adecuada ventilación antes del realojo de los animales.

PRECAUCIONES

Leer la etiqueta antes del uso. Mantener fuera del alcance de los niños y animales. Usar equipo de protección adecuado para aplicar el producto. Aclarar cualquier resto de producto tras el tratamiento de superficies y utensilios que estén en contacto con alimentos o bebidas de los animales. Mantener a los animales alejados del producto. No mezclar con otros productos químicos. Evitar el contacto con las superficies tratadas.

Con relación al usuario por público en general: No aplicar en presencia de animales ni personas. No aplicar en áreas accesibles a niños. Una vez aplicado el producto, ventilar adecuadamente el área donde se realiza la aplicación. No aplicar con otros productos químicos. Evitar el contacto de los animales y personas con superficies tratadas o expuestas.

GESTIÓN DE ENVASES

Envases vacíos, restos de producto, agua de lavado, contenedores y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Entréguese dichos residuos a un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente.

CADUCIDAD

A partir de los 3 años de la fecha de fabricación, el producto puede ir reduciendo paulatinamente su efectividad.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

Conservar en lugar fresco y seco.

PRESENTACION

Envase de 1 L.