



**GAMA BIOSEGURIDAD
FAMILIA DISQUIM**

DISQUIM OXYVIR SP

Desinfectante oxidante en polvo soluble
Monopersulfato potásico

*Desinfección por contacto de superficies
no porosas en el entorno ganadero*

Desinfección terminal

COMPOSICIÓN

Monopersulfato potásico.....51,8%
Excipientes c.s.p.....100%

REGISTRO

Reg. Of. P. Zoosanitarios: 12606-P.
Uso en entorno ganadero. Desinfección por contacto de superficies no porosas (suelos, paredes, techos, incubadoras vacías).

PRESENTACIÓN

Envase de 5 kg, caja con 4 unidades.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

- Aspecto: Sólido granulado
- Color: Rosa
- Densidad a 20°C: 1712,1 kg/m³
- pH: 1 – 2 (al 5%)
- Solubilidad: Soluble en agua

MODO DE EMPLEO

Antes de usar el producto lea detenidamente la etiqueta. Aplicación, previa dilución de DISQUIM OXYVIR SP en agua, por pulverización. Realice el tratamiento y la limpieza previa en ausencia de animales, piensos y agua de consumo. Evite aplicar DISQUIM OXYVIR SP sobre superficies que vayan a estar en contacto con alimentos o agua de bebida de los animales. Aclare con agua aquellas superficies cercanas o en contacto con los animales.

DOSIS Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Desinfección de superficies no porosas en condiciones limpias:

- **Actividad bactericida:** Diluya DISQUIM OXYVIR SP al 2% (20g/1 L agua). Aplique la dilución obtenida por pulverización. Tiempo de contacto necesario 30 minutos.
- **Actividad fungicida:** Diluya DISQUIM OXYVIR SP al 10% (100g/1 L agua). Aplique la dilución obtenida por pulverización. Tiempo de contacto necesario 60 minutos.

Plazo de seguridad: 12 horas. Ventile completamente antes de reintroducir a los animales.

PRECAUCIONES

No debe mezclarse con ningún otro producto químico. Lávese las manos concienzudamente tras la manipulación. La intoxicación puede producir desde irritación a corrosión de piel, ojos, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal.

GESTIÓN DE ENVASES

Elimínense el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso a través de un gestor autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.

ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO

Almacenar DISQUIM OXYVIR SP evitando fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con los alimentos.

Fecha de caducidad: 3 años a partir de la fecha de fabricación.