



GAMA BIOSEGURIDAD FAMILIA INSQUIM

INSQUIM NO-LARV IGR

Insecticida-larvicida granulado, actúa como regulador del crecimiento en moscas.

Interfiere en el ciclo de vida de la mosca evitando que completen su desarrollo a insectos adultos, alcancen la madurez y se reproduzcan.

CARACTERÍSTICAS

INSQUIM NO-LARV IGR ejerce su acción en el estadio menos visible de la población de moscas, concretamente en las primeras etapas de su desarrollo y que representa la mayor parte (casi el 80%) de la población total de moscas. Usado de manera correcta, reduce de forma significativa la cantidad de moscas que llegan a la forma adulta. El producto libera la sustancia activa lentamente, con lo que se consigue un efecto duradero. Se recomienda utilizar un insecticida con un buen efecto letal para la eliminación de las moscas adultas presentes.

COMPOSICIÓN

5-Metopreno ... 0,421%

INDICACIONES

El producto está desarrollado, exclusivamente, para el control de las plagas de moscas y moscardones en el entorno ganadero.

- Mosca común: *Musca domestica*
- Mosca de los establos: *Stomoxys calcitrans*

REGISTRO

Autorización Biocida N.º: ES/BB(MR)-2020-18-00710.
Categoría de usuario: Personal profesional (ganadero).

MODO DE EMPLEO Y DOSIS

Método de aplicación: Dispersión. El producto debe extenderse, a boleó, sobre la superficie del estiércol, a mano, con una taza medidora o un dispositivo apropiado, por ejemplo, un aplicador de gránulos de manos (tipo Granomax 5).

La dosis general es de 25-30 g de INSQUIM NO-LARV IGR por cada m².

Con un cubo de 2,5 kg se podrá tratar hasta 100 m² (2,5 a 3 kg por cada 100 m² en función del grado de infestación).

INSQUIM NO-LARV IGR se debe aplicar mediante dispersión del granulado, a boleó o con dispensador automático, sobre la superficie del estiércol. Concéntrese en las zonas próximas a los bebederos, los comederos y las zonas donde la humedad tiende a acumularse. Como norma general, tras la aplicación, se recomienda humedecer las zonas tratadas para una más rápida activación de la eficacia. Para un control completo de la plaga de moscas, se aconseja el uso simultáneo de un insecticida adulticida.

El tratamiento tiene una persistencia de hasta 90 días (12 semanas).

El producto puede aplicarse en presencia de animales siempre que se evite el contacto directo con estos durante el tratamiento (no aplicar sobre los animales, bebederos ni comederos). Frecuencia: El número máximo de aplicaciones por año será de 6.



ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO

El producto es estable durante 3 años a partir de la fecha de fabricación.

Conservar el producto bien cerrado en su envase original, en lugar fresco y seco. Antes de utilizar el producto, lea atentamente la etiqueta.

PRESENTACIÓN

Envase 2,5 kg.

