



## GAMA BIOSEGURIDAD FAMILIA RASQUIM

# CEBO FRESCO RASQUIM BLUE BF29

Rodenticida anticoagulante en pasta de uso no profesional.

*Es un cebo rodenticida en pasta, listo para su uso, presentado en porciones de 15 g, indicado para el control de roedores como Ratón común (*Mus musculus*) y Rata parda o de alcantarilla (*Rattus norvegicus*).*

### COMPOSICIÓN

Brodifacoum 0,0029%

Nº Registro / Autorización: ES/MR(NA)-2021-14-00750

### CATEGORÍA DE USUARIO

Público en general (usuario no profesional).

### CARACTERÍSTICAS

CEBO FRESCO RASQUIM BLUE BF29 es un cebo en pasta rodenticida listo para su uso. Para el control de infestaciones de rata parda o de alcantarilla (*Rattus norvegicus*) y ratón común (*Mus musculus*), en todas las etapas de desarrollo (adultos y juveniles). Contiene brodifacoum, principio activo anticoagulante de segunda generación. CEBO FRESCO RASQUIM BLUE BF29 es extremadamente atractivo y palatable para los roedores, siendo muy apetecible, y su uso está indicado en áreas del entorno doméstico. CEBO FRESCO RASQUIM BLUE BF29 incorpora una sustancia de sabor amargo (Benzoato de denatonio) para prevenir la ingesta accidental por animales no diana.

### MODO DE EMPLEO

CEBO FRESCO RASQUIM BLUE BF29 es un cebo en pasta listo para su uso. Usar guantes protectores resistentes a productos químicos durante la fase de manipulación. Colocar la porción de 15 g (sin romper) en portacebos resistentes a la manipulación, en el interior y / o alrededor de edificaciones.

### DOSIS Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

• **Ratones interior:** -Infestación alta: Hasta 50 gramos de cebo por portacebos. Si se necesita utilizar más de un portacebos, la distancia mínima entre portacebos será de 2 metros.

- Infestación baja: hasta 50 gramos de cebo por portacebos. Si se necesita utilizar más de un portacebos, la distancia mínima entre portacebos será de 5 metros

• **Ratas interior y alrededor de edificaciones:** -Infestación alta: Hasta 90 gramos (bolsitas) o 100 gramos (bolsitas) de cebo por portacebos. Si se necesita utilizar más de un portacebos la distancia mínima entre portacebos será de 5 metros.

- Infestación baja: hasta 90 gramos (bolsitas) o 100 gramos (bandejas) de cebo por portacebos. Si se necesita utilizar más de un portacebos, la distancia mínima entre portacebos será de 10 metros.

Los portacebos deben revisarse a los 5 – 7 días después del comienzo del tratamiento y posteriormente, como mínimo, una vez a la semana, para comprobar la aceptación del cebo, que los portacebos están intactos y para retirar los roedores muertos. Recargar el portacebos cuando sea necesario.

### ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO

El producto es estable durante dos años desde la fecha de fabricación que aparece en el envase. Almacenar en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantener el envase cerrado y alejado de luz.

### PRESENTACIÓN

Estuche con 150g (10 bolsas de 15 g). Caja con 24 estuches.