



GAMA BIOSEGURIDAD FAMILIA RASQUIM

FRAP® PASTA

Rodenticida cebo anticoagulante en pasta de uso no profesional.

*Es un cebo rodenticida en pasta, listo para su uso, presentado en porciones de 10 g, indicado para el control de roedores como Rata parda o de alcantarilla (*Rattus norvegicus*), Rata negra (*Rattus rattus*) y Ratón común (*Mus musculus*).*

COMPOSICIÓN

Difetialona 0,0025%.

N.º Registro / Autorización: ES/MR(NA)-2018-14-00021.

CATEGORÍA DE USUARIO

Personal no profesional (Público en general).

CARACTERÍSTICAS

FRAP® PASTA contiene Difetialona, un anticoagulante de segunda generación que actúa eficazmente con una sola ingesta.

FRAP® PASTA contiene sustancias alimentarias y materias grasas de primera calidad altamente apetentes y palatables para los roedores. Su cebo en pasta tiene una excelente textura, manteniéndose fresca sin liberar grasa.

FRAP® PASTA también incorpora también una sustancia de sabor amargo (Benzoato de Denatonio) para prevenir la ingesta accidental por niños y animales domésticos (no diana).

MODO DE EMPLEO

FRAP® PASTA es un cebo listo para su uso. Coloque la porción de 10 g (sin romper) en portacebos resistentes a la manipulación, en interiores y/o alrededor de edificaciones.

DOSIS Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

En interiores aplicar a las siguientes dosis:

- **Ratones:** portacebos con hasta 50 g de FRAP® PASTA. Si se necesita utilizar más de un portacebo, la distancia mínima entre portacebos será de 1 metro.
- **Ratas:** portacebos con hasta 150 g de FRAP® PASTA. Si se necesita utilizar más de un portacebo, la distancia mínima entre portacebos será de 4 metros.

Alrededor de edificaciones aplicar a las siguientes dosis:

- **Ratas:** portacebos con hasta 150 g de FRAP® PASTA. Si se necesita utilizar más de un portacebo, la distancia mínima entre portacebos será de 4 metros.

ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO

FRAP® PASTA es estable durante cuatro (4) años a temperatura ambiente. Almacenar el producto en su envase original, cerrado, en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantener alejado de la radiación solar, otras fuentes de calor y fuentes de fuerte olor. Proteger frente a las heladas.

GESTION DE ENVASES

Al final del tratamiento elimínese el cebo no consumido, el envase y los portacebos, al final de su vida útil, como residuo peligroso de conformidad con lo que establezcan las ordenanzas municipales.

PRESENTACIÓN

Estuche de 150 g (porciones individuales en papel de filtro de 10 g), caja con 12 estuches.