

## GAMA BIOSEGURIDAD FAMILIA RASQUIM

# CEBO FRESCO RASQUIM® DF29

Rodenticida anticoagulante en cebo fresco de uso profesional.

*Es un cebo rodenticida en pasta, listo para su uso con cereales, presentado en porciones de 10 g, indicado para el control de roedores como Ratón común (*Mus musculus*) y Rata parda o de alcantarilla (*Rattus norvegicus*) en todas las etapas de su desarrollo.*



### COMPOSICIÓN

Difenacoum 0,0029%.

### REGISTRO BIOCIDA

N.º Registro / Autorización: ES/BB(MR)-2026-14-00275.

### CATEGORÍA DE USUARIO

Personal profesional (Ganadero).

### CARACTERÍSTICAS

CEBO FRESCO RASQUIM® DF29 contiene Difenacoum, un anticoagulante de segunda generación que actúa eficazmente con una sola ingesta, provocando la muerte de los roedores sin despertar sospechas hacia el cebo por parte de los otros miembros de la colonia.

Su formulación PASTA PLUS, con ingredientes de origen alimentario de primera calidad enriquecidos con cereales, maximiza y asegura una alta palatabilidad incluso en entornos con fuerte competencia alimentaria.

CEBO FRESCO RASQUIM® DF29 es versátil y apetecible. Apto para instalaciones eléctricas, medios de transporte y áreas del entorno de los animales. Incorpora una sustancia de sabor amargo (Benzoato de Denatonium) para prevenir la ingesta accidental por niños y animales.

### MODO DE EMPLEO

Colocar la porción de 10 g (sin romper) en portacebos resistentes a la manipulación, en el interior y/o alrededor de edificaciones.

### DOSIS Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

En interiores aplicar a las siguientes dosis:

- Ratones: portacebos con hasta 50 g de producto cada 2 - 5 m (cada 2 metros en altas infestaciones y 5 metros en bajas).
- Ratas: portacebos con hasta 100 g de producto cada 5 - 10 m (cada 5 metros altas infestaciones y 10 metros en débiles).

Alrededor de edificaciones aplicar a las siguientes dosis:

- Ratas: portacebos con hasta 100 g de producto cada 5 - 10 m (cada 5 metros en altas infestaciones y 10 metros en bajas).

Los portacebos deben revisarse al menos cada 2 - 3 días (ratones) y al menos cada 5 - 7 días (ratas) al comienzo del tratamiento y posteriormente, como mínimo, una vez a la semana. Modo de acción retardado entre 4 y 10 días. Su uso debería eliminar los roedores objetivo en un plazo de 35 días.

### ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO

Vida útil de dos (2) años desde la fecha de fabricación. Almacenar el envase cerrado, alejado de la luz, en un lugar seco, fresco y bien ventilado sin superar los 35°C de temperatura. Mantener fuera del alcance de los niños, pájaros, mascotas y animales de granja.

### GESTIÓN DE ENVASES

Elimine el cebo no consumido, el envase, los portacebos y los roedores muertos como residuo peligroso conforme a la normativa vigente.

### PRESENTACIÓN

Caja de cartón de 10 Kg (10 bolsas de 1 Kg con porciones individuales de papel de filtro de 10 g).