



## GAMA BIOSEGURIDAD FAMILIA RASQUIM

# RASQUIM BLOQUE BF

Rodenticida anticoagulante en bloque parafinado de uso profesional.

*Es un cebo rodenticida en bloque, estriado y perforado, presentado en 10 g, indicado para el control de roedores como Ratón común (*Mus musculus*) y Rata parda o de alcantarilla (*Rattus norvegicus*).*



### COMPOSICIÓN

Brodifacoum 0,0025%

Nº Registro / Autorización: ES/APP(NA)-2018-14-00554

### CATEGORÍA DE USUARIO

Personal profesional (Uso ganadero).

### CARACTERÍSTICAS

RASQUIM BLOQUE BF contiene Brodifacoum, un anticoagulante de segunda generación que actúa eficazmente con una sola ingesta, se le define también como "superwarfarina". Muy **POTENTE** y **EFICAZ**.

RASQUIM BLOQUE BF contiene sustancias alimentarias y cereales de primera calidad altamente atrayentes y palatables para los roedores. Incorpora también una sustancia de sabor amargo (Benzoato de Denatonium) para prevenir la ingesta accidental por niños y animales domésticos.

### MODO DE EMPLEO

RASQUIM BLOQUE BF es un cebo en bloque parafinado listo para su uso. Se recomienda el uso de guantes. Colocar los bloques en portacebos resistentes a la manipulación, en el interior y / o alrededor de edificaciones.

### PRESENTACIÓN

Bloque parafinado, estriado y perforado de 10 g en cubo con 3 kg.

### DOSIS Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

-Para el control de ratón común (*Mus musculus*) – interior: **Alta infestación:** 20-40 g de cebo por portacebo. Si se necesita utilizar más de un portacebo, la distancia mínima entre portacebos será de 5 metros. **Baja infestación:** 20-40 g de cebo por portacebo. Si se necesita utilizar más de un portacebo, la distancia mínima entre portacebos será de 10 metros. Los portacebos deben revisarse al menos cada 2-3 días al comienzo del tratamiento y posteriormente, como mínimo, una vez a la semana.

-Para el control de rata parda o de alcantarilla (*Rattus norvegicus*) – interior y alrededor de edificaciones: **Alta infestación:** 100-200 g de cebo por portacebo. Si se necesita utilizar más de un portacebo, la distancia mínima entre portacebos será de 5 metros. **Baja infestación:** 100-200 g de cebo por portacebo. Si se necesita utilizar más de un portacebo, la distancia mínima entre portacebos será de 10 metros. Los portacebos deben revisarse al menos cada 5-7 días al comienzo del tratamiento y posteriormente, como mínimo, una vez a la semana.

### ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO

El producto es estable durante un mínimo de dos años a temperatura ambiente. Utilícese hasta la fecha de caducidad mostrada en el envase. Almacenar el producto en su envase original, cerrado, en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantener alejado de la radiación solar y otras fuentes de calor. Mantener alejado de fuentes de fuerte olor. Proteger frente a las heladas.