



RASQUIM CEBO FRESCO BF

Rodenticida anticoagulante en pasta de uso no profesional.

*Es un cebo rodenticida en pasta, listo para su uso, presentado en porciones de 15 g, indicado para el control de roedores como Ratón común (*Mus musculus*) y Rata parda o de alcantarilla (*Rattus norvegicus*).*

COMPOSICIÓN

Brodifacoum 0,0029% (29 ppm).

Nº Registro / Autorización: ES/MR(NA)-2018-14-00492.

CATEGORÍA DE USUARIO

Usuario no profesional (Público en general).

CARACTERÍSTICAS

RASQUIM CEBO FRESCO BF es un cebo en pasta listo para el uso en bolsitas de 15 g para el control de ratón común y rata parda o de alcantarilla en todas las etapas del desarrollo, que contiene el ingrediente activo anticoagulante de segunda generación, brodifacoum, activo con una sola ingestión. Gracias a su modo de acción, la muerte de los roedores se produce sin despertar sospechas hacia el cebo por parte de los demás miembros de la colonia. Gracias a su alta palatabilidad, el cebo en pasta es extremadamente versátil y su uso está indicado en áreas que ofrezcan una fuerte competencia por los alimentos. Incorpora una sustancia de sabor amargo (*Denatonium Benzoato*) para prevenir la ingesta accidental por animales no diana.

MODO DE EMPLEO

Usar guantes protectores resistentes a productos químicos durante la fase de manipulación. Colocar la porción de 15 g (sin romper) en portacebos resistentes a la manipulación, en el interior y / o alrededor de edificaciones.

DOSIS Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

- **Ratones interior:** -Infestación alta: Hasta 50 gramos de cebo por portacebos. Si se necesita utilizar más de un portacebo, la distancia mínima entre portacebos será de 2 metros.
- Infestación baja: hasta 50 gramos de cebo por portacebos. Si se necesita utilizar más de un portacebo, la distancia mínima entre portacebos será de 5 metros
- **Ratas interior y alrededor de edificaciones:** -Infestación alta: Hasta 90 gramos (bolsitas) de cebo por portacebos. Si se necesita utilizar más de un portacebo la distancia mínima entre portacebos será de 5 metros.
- Infestación baja: hasta 90 gramos (bolsitas) de cebo por portacebos. Si se necesita utilizar más de un portacebo, la distancia mínima entre portacebos será de 10 metros.
Los portacebos deben revisarse a los 2 -3 días (control de ratones en interior) ó 5 - 7 días (control de ratas) después del comienzo del tratamiento y posteriormente, como mínimo, una vez a la semana, para comprobar la aceptación del cebo, que los portacebos están intactos y para retirar los roedores muertos. Recargar el portacebo cuando sea necesario.

ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO

El producto es estable durante dos (2) años desde la fecha de fabricación que aparece en el envase. Almacenar en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantener el envase cerrado y alejado de luz.

PRESENTACIÓN

Estuche con 150 g (10 bolsas de 15 g). Caja con 12 estuches.