



**GAMA BIOSEGURIDAD  
FAMILIA RASQUIM**

## RASQUIM CEREAL BD

Rodenticida anticoagulante en grano de uso profesional.

*Es un cebo rodenticida en grano, listo para su uso, indicado para el control de roedores como Rata parda o de alcantarilla (*Rattus norvegicus*) y Ratón común (*Mus musculus*).*

### COMPOSICIÓN

Bromadiolona 0,0029%.

Nº Registro / Autorización: ES/APP(NA)-2018-14-00170

### CATEGORÍA DE USUARIO

Personal profesional (Uso ganadero).

### CARACTERÍSTICAS

RASQUIM CEREAL BD contiene Bromadiolona, un anticoagulante de segunda generación que actúa eficazmente con una sola ingesta.

RASQUIM CEREAL BD es un cebo rodenticida formulado con una mezcla de cereales enteros impregnados (también en su interior) con el ingrediente activo bromadiolona. Incorpora también una sustancia de sabor amargo (Benzoato de Denatonium) para prevenir la ingesta accidental por niños y animales domésticos.

### MODO DE EMPLEO

RASQUIM CEREAL BD es un cebo en grano listo para su uso. Se recomienda el uso de guantes. Colocar el cebo en grano en el interior de portacebos resistentes a la manipulación, en el interior y / o alrededor de edificaciones.

### PRESENTACIÓN

Uso profesional (ganadero): caja de cartón con 10 kg (en bolsitas microperforadas de 25 g o granel).

### DOSIS Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Uso profesional (Ganadero):

- En interiores aplicar RASQUIM CEREAL BD a las siguientes dosis:  
-Ratones: portacebos con hasta 60 g de producto cada 5-10 metros (cada 5 metros en áreas con alto grado de infestación y 10 metros en una infestación débil).

- Ratas: portacebos con hasta 100 g de producto cada 5-10 metros (cada 5 metros en áreas con alto grado de infestación y 10 metros en una infestación débil). Los portacebos deben revisarse al menos cada 2 - 3 días al comienzo del tratamiento y posteriormente, como mínimo, una vez a la semana.

- Alrededor de edificaciones aplicar RASQUIM CEREAL BD a las siguientes dosis:

- Ratas: portacebos con hasta 100 g de producto cada 5-10 metros (cada 5 metros en áreas con alto grado de infestación y 10 metros en una infestación débil). Los portacebos deben revisarse a los 5-7 días después del comienzo del tratamiento y posteriormente, como mínimo, una vez a la semana.

### ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO

El producto es estable durante un mínimo de dos años a temperatura ambiente. Almacenar en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantener el envase cerrado y alejado de luz. Mantener fuera del alcance de los niños, pájaros, mascotas y animales de granja.