

Gama



Hogar



## RASQUIM CEREAL BF

Rodenticida anticoagulante en grano de uso no profesional.

Es un cebo rodenticida en grano, listo para su uso, presentado en bolsas de 25 g, indicado para el control de roedores como Ratón común (*Mus musculus*) y Rata parda de alcantarilla (*Rattus norvegicus*).

### COMPOSICIÓN

Brodifacoum 0,0029% (29 ppm).

Nº Registro / Autorización: ES/MR(NA)-2018-14-00495.

### CATEGORÍA DE USUARIO

Público en general (usuario no profesional).

### CARACTERÍSTICAS

RASQUIM CEREAL BF es un cebo en grano listo para el uso en bolsas de 25 g para el control de ratón común y rata parda o de alcantarilla en todas las etapas del desarrollo, que contiene el ingrediente activo anticoagulante de segunda generación, brodifacoum, activo con una sola ingestión. Gracias a su modo de acción, la muerte de los roedores se produce sin despertar sospechas hacia el cebo por parte de los demás miembros de la colonia. Incorpora una sustancia de sabor amargo (*Denatonium Benzoato*) para prevenir la ingesta accidental por animales no diana.

### MODO DE EMPLEO

Usar guantes protectores resistentes a productos químicos durante la fase de manipulación. Colocar las bolsas de 25 g (sin romper) en portacebos resistentes a la manipulación, en el interior y/o alrededor de edificaciones.

### DOSIS Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

- **Ratones interior:** -Infestación alta: Hasta 50 gramos de cebo por portacebos. Si se necesita utilizar más de un portacebos, la distancia mínima entre portacebos será de 2 metros.  
- Infestación baja: hasta 50 gramos de cebo por portacebos. Si se necesita utilizar más de un portacebos, la distancia mínima entre portacebos será de 5 metros
- **Ratas interior y alrededor de edificaciones:** -Infestación alta: Hasta 100 gramos (bolsas) de cebo por portacebos. Si se necesita utilizar más de un portacebos la distancia mínima entre portacebos será de 5 metros.  
- Infestación baja: hasta 100 gramos (bolsas) de cebo por portacebos. Si se necesita utilizar más de un portacebos, la distancia mínima entre portacebos será de 10 metros. Los portacebos deben revisarse a los 2 -3 días (control de ratones en interior) ó 5 - 7 días (control de ratas) después del comienzo del tratamiento y posteriormente, como mínimo, una vez a la semana, para comprobar la aceptación del cebo, que los portacebos están intactos y para retirar los roedores muertos. Recargar el portacebos cuando sea necesario.

### ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO

El producto es estable durante dos (2) años desde la fecha de fabricación que aparece en el envase. Almacenar en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantener el envase cerrado y alejado de luz.

### PRESENTACIÓN

Estuche con 150 g (6 bolsas de 25 g). Caja con 12 estuches.