



DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Utilizar el producto en pediluvios (baños podales). Diluir el producto en agua a una concentración (dosis de mantenimiento) del 3% (30 ml en 1 litro de agua) para tratamientos preventivos continuados (dos veces por semana). En épocas de alta humedad aumentar la dosis a 5% (50 ml en 1 litro de agua). Hacer pasar a los animales a través del pediluvio o baño de pies con la mezcla asegurándonos que el nivel del agua cubre bien la pezuña. Idealmente, eliminar la suciedad de las pezuñas previamente al paso de los animales por el baño usando agua a presión, una manguera o un pediluvio previo con agua únicamente. Para tratamientos de choque o intensivo, aumentar la dosis al 8% - 10% (entre 8-10 litros de Viral Econo por 100 litros de agua).

Se recomienda pasar las vacas por el pediluvio como mínimo una vez a la semana, idealmente dos veces a la semana. Los animales deberán pasar a través del pediluvio, con Viral Econo, dejando seguidamente, que el ganado descansa en suelo limpio por lo menos durante una hora.

En el caso de que exista un problema grave de dermatitis en la explotación, se recomienda aumentar la frecuencia de baños podales de tres y hasta cuatro veces por semana y se recomienda eliminar previamente la materia córnea afectada y alterada para facilitar la acción del producto. No usar un pediluvio más de 200 pases de vacas.

Para aplicación directa sin pediluvios (baños podales). Diluir el producto al 50% y aplicar sobre la pezuña previamente lavada con agua.

Se recomienda no excederse de estas concentraciones de uso.

PRECAUCIONES, SEGURIDAD E HIGIENE

Almacenar en lugar fresco y ventilado alejado de la luz solar. Al manipular el producto es necesario utilizar la protección adecuada (guantes de vinilo o látex y gafas de protección para ojos y cara). Evite la ingestión, contacto con la piel, ojos y mucosas, así como la inhalación, aplique en lugares suficientemente ventilados y use protección adecuada.

Si el producto salpica sobre la piel u ojos, lavar con agua abundante y acudir al médico. En caso de ingestión accidental es necesario recibir tratamiento médico lo antes posible. Elimine los restos de producto no utilizado y/o los envases de acuerdo a la normativa local.

ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO

El producto es estable durante 2 (dos) años a partir de la fecha de fabricación a temperatura ambiente. Conservar el producto en su envase original, cerrado, en lugar fresco y seco al abrigo de la luz y el calor.

