

 **RACUMIN™**
Expert

+ **Apetencia
mejorada**

+ **Menor impacto
ambiental***

+ **Mejor
eficacia**



**27
ppm**

Nueva formulación Racumin Eficacia concentrada

- ✓ Excelente apetencia aún en caso de competencia alimentaria
- ✓ Se puede utilizar en zonas al aire libre y madrigueras
- ✓ Excelente eficacia sobre ratas y topillos


envu™

Ficha técnica Rodenticida

Más que un producto ...

Racumin® EXPERT es un cebo rodenticida listo al uso en forma de pasta en porción de 20 g. Contiene cumatetralilo a una concentración de 27 ppm, un anticoagulante de primera generación que provoca hemorragias internas y que llevan a la muerte del roedor. Esta aparece algunos días después de la ingestión, dando la apariencia de una muerte natural y no despierta ninguna sospecha en sus congéneres.

Control de ratas, ratones y topillos (adultos y juveniles): con una acción formidable



Eficacia probada aún a dosis baja

- El cumatetralilo es un anticoagulante de los denominados multidosis: el periodo de ingestión es un factor clave para controlar la población de roedores (toxicidad crónica). Es importante garantizar que los cebos se consuman durante 2 a 7 días.
- Gracias a la excelente palatabilidad del cebo en forma de pasta, los roedores ingerirán repetidamente la sustancia activa.

Dosis y usos recomendados


Utilización y especies diana:

- **Periodo de utilización:** todo el año en función del grado de infestación de roedores.
- **Modo de aplicación:** Cebo listo para su uso, utilizar en portacebos de alta seguridad. Es posible la aplicación de los cebos directamente en la madrigueras.
- **Dosis :**

ESPECIES DIANA	CANTIDAD DE CEBO POR PUNTO	APLICACIÓN
Ratas	100 a 200 g	Baja infestación: 100 g de cebo por punto de cebado. Alta infestación: 100 a 200 g de cebo por punto de cebado. Si se necesita mas de un portacebos, la distancia mínima entre portacebos será de 5 metros.
Ratones y Topillos	20 g	Aplicar 20 g de cebo por portacebos. Si se necesita más de una estación de cebo, la distancia mínima entre portacebos debe ser de 2 a 10 metros.

Más información

Dónde aplicar el producto

INTERIOR*	EXTERIOR, ALREDEDOR DE EDIFICIOS	ZONAS ABIERTAS EXTERIORES			
					
VIVIENDAS, FÁBRICAS...	VERTEDEROS EXTERNOS Y CENTROS DE RECOGIDA DE RESIDUOS	PARQUES Y JARDINES, TERRENOS DEPORTIVOS, ZONAS INDUSTRIALES	GRANJAS DE AVES Y RECINTOS AL AIRE LIBRE	DIRECTAMENTE DENTRO DE LAS MADRIGUERAS	

Condiciones para la aplicación directa de cebos en madrigueras:

- **Cubra o bloquee las entradas a la madriguera** donde se coloca el cebo para reducir el riesgo de diseminación de los cebos al exterior.
- El cebo no debe ser visible desde fuera de la madriguera.
- Proteger los cebos de las condiciones atmosféricas (ej.: lluvia, nieve, etc.). Colocar el portacebos en zonas no sujetas a inundación.
- Aplicación solo por personal especializado.



Lo esencial ...

✓ **Apetencia mejorada**

✓ **Rápido control de la rata parda (*Rattus norvegicus*)**

✓ **Incluso a dosis bajas**

Modo de empleo

Antes de colocar un cebo tóxico, debe realizarse una inspección del lugar para asegurarse de :

- Identificar las especies.
- Identificar las zonas de paso (huellas, heces, etc.) para colocar los portacebos en los lugares adecuados.
- Adaptar el número de cebos recomendados por portacebos a la dosis eficaz recomendada y respetar los intervalos de aplicación del producto.
- El número de portacebos debe ajustarse en función del lugar de tratamiento, el contexto geográfico y la extensión y gravedad de la infestación.
El seguimiento del consumo de cebo es esencial para el éxito del control. Los portacebos deben inspeccionarse cada 2 ó 3 días (para el control de topillos) o cada 5 ó 7 días (para el control de ratas) y después semanalmente.
- Los portacebos deben rellenarse con cebo nuevo si se han comido o están muy dañados.

Evaluación y gestión de riesgos

- Guardar los cebos no utilizados en un lugar seguro.
- Conservarlos en el envase original.
- Conservarlo en lugar seco, fresco y bien ventilado.
- Mantener el envase bien cerrado y alejado de la luz solar directa.
- Conservar y mantener el producto fuera del alcance de los niños, pájaros, animales domésticos, ganado y otros animales no objetivo.
- Los productos no deben utilizarse durante más de 35 días sin evaluar el estado de la infestación y la eficacia del tratamiento.
- No utilizar el producto como cebo permanente para prevenir la infestación o para controlar la actividad de los roedores.





Impacto sobre las especies no diana

- Riesgo de intoxicación primaria: La sustancia activa coumatetralilo tiene una DL50 más alta en perros que los rodenticidas de segunda generación. Se necesitan 6,1 kg de Racumin® Expert para alcanzar la DL50* en un perro de 10 kg.
- Riesgos de intoxicación secundaria: El coumatetralilo se metaboliza por los roedores a los pocos días de su ingesta. Los niveles de residuos en el organismo son inferiores a los de otras sustancias activas anticoagulantes.
- Racumin® Expert contiene un agente colorante y amargante (Bitrex®) que reduce el riesgo de absorción accidental por los seres humanos, especialmente los niños, sin reducir la palatabilidad para los roedores.

Ultra sabroso

- Los cereales, el aceite vegetal y los hidratos de carbono de Racumin® Expert son excepcionalmente apetecibles para ratas y topillos. Esta característica es una garantía de rápida eficacia
- Racumin® Expert puede utilizarse en condiciones variables (calor, humedad, polvo) y para todas las zonas infestadas. Gracias a su alto contenido en grasa, la pasta sigue siendo atractiva y eficaz durante mucho tiempo.

Nuevos envases para una gestión moderna y sostenible

- Fabricado con un 80% menos de plástico que los envases estándar (como los cubos).
- Ligero, práctico y fácil de usar.

** DL50 : Cantidad de una sustancia, administrada en una sola dosis, que provoca la muerte del 50% de un grupo de animales.*





Autorización biocida: ES/MR(NA)-2022-14-00810

Tipo de producto: TP14 Rodenticida

Composición: 0,0027% de cumatetralilo

Formulación: Cebo listo para su uso (RB)

Envase: Porción de pasta de 20 g en bolsa zip-lock
con 5 kg

Producto no clasificado

Equipos de Protección Personal (EPI)



GUANTES

Llevar guantes de protección
(nitrilo tipo EN374)

FICHA DE IDENTIDAD Racumin® Expert

Categoría de usuario:

Usuario profesional y personal
profesional especializado

Usos:

-Ratas: Ámbito(s) de utilización Interior de edificios (viviendas, fábricas, etc.) y explotaciones ganaderas (cerdos, aves, ganado bovino, etc.). Exterior alrededor de edificaciones (viviendas, fábricas, etc.) y en explotaciones ganaderas (cerdos, aves, ganado bovino, etc.).
-Ratones: Interiores de edificios (viviendas, fábricas, etc.) y en grajas de cría de animales (cerdos, aves de corral, ganado vacuno, etc.).
-Topillos: Exterior alrededor de edificios (viviendas, fábricas, etc.) y en explotaciones ganaderas (cerdos, aves, ganado bovino, etc.).
-Aplicación directa del cebo listo para su uso en madrigueras, solo por personal especializado.

Periodo de utilización: Todo el año en función de las infestaciones de roedores.



Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el biocida antes de usarlo.

Envu, the Envu logo and Racumin® Expert are trademarks owned by Environmental Science U.S. LLC. or one of its affiliates.

Distribuido por: QUIMICAMP HIGIENE, S.L.
Ctra. de Logroño km. 10,200 - 50180 UTEBO (ZARAGOZA)
Teléfono: +34 976 786 464 - Fax: +34 976 785 799
info@quimicamphigiene.com - www.quimicamphigiene.com