

**GAMA BIOSEGURIDAD
FAMILIA RASQUIM****RASQUIM MIX
BF27 TOPILLO**

Rodenticida anticoagulante en cereal
listo uso.

*Indicado para el control total de las poblaciones de topillo común (*Microtus arvalis*), ratón común (*Mus musculus*), rata parda o de alcantarilla (*Rattus norvegicus*) y rata negra (*Rattus rattus*), en todas las etapas del desarrollo.*

COMPOSICIÓN: Brodifacoum 0,0027%.

CATEGORÍA DE USUARIO: Personal profesional.

CARACTERÍSTICAS

Cebo de última generación que proporciona un control total de las poblaciones de roedores resistentes conocidas. Contiene brodifacoum, que actúa con una sola ingestión, produciendo la muerte de los roedores sin despertar sospechas. Además, incorpora una sustancia de sabor amargo (Denatoniun Benzoato) para ayudar a prevenir el consumo humano y otras especies no diana. RASQUIM MIX BF27 TOPILLO combina azúcar y 3 cereales especialmente atrayentes (maíz partido, copos de avena, semillas de girasol enteras). Ideal para tratamientos donde la dieta de los roedores se basa principalmente en semillas de maíz (entornos rurales). Gracias a su tecnología FLUO-NP®, tanto el cebo como los excrementos de los roedores brillan intensamente bajo la luz UV, siendo fáciles de identificar incluso en condiciones de poca luz, lo que hace posible rastrear el movimiento de los roedores.

MODO DE EMPLEO

Cebo en grano listo para su uso en portacebos resistentes a la manipulación. Lea detenidamente la etiqueta y siga las instrucciones. Se recomienda el uso de un dosificador y guantes durante la manipulación. Para uso en los alrededores de edificaciones: proteja los cebos de las condiciones atmosféricas. Coloque los portacebos en zonas no sujetas a inundación. No utilice el producto cerca de aguas superficiales. Reemplace el cebo que haya sido dañado por el agua o contaminado por la suciedad. **El producto se podrá aplicar directamente en madrigueras solo por personal profesional especializado.**

DOSIS Y FRECUENCIAS DE APLICACIÓN

Para el control de ratón común (*Mus musculus*; para uso solo interior) y topillo común (*Microtus arvalis*; interior y alrededor de edificaciones): 45-50g de cebo por portacebos. Si se necesita utilizar más de un portacebo, la distancia mínima entre portacebos será de 2-5 metros. Los portacebos deben revisarse al menos cada 2 - 3 días al comienzo del tratamiento y, posteriormente, como mínimo una vez a la semana.

Para el control de rata parda o de alcantarilla (*Rattus norvegicus*) y rata negra (*Rattus rattus*) - interior y alrededor de edificaciones: 90-100g de cebo por portacebos. Si se necesita utilizar más de un portacebo, la distancia mínima entre portacebos será de 5-10 metros. Los portacebos deben revisarse al menos cada 5 - 7 días después del comienzo del tratamiento y, posteriormente, como mínimo una vez a la semana.

ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO

Vida útil, 2 años desde la fecha de fabricación. Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener alejado de la radiación solar. Mantener alejado de los niños, pájaros y animales de compañía y granja. Almacenar a temperaturas inferiores a 35°C. Proteger de la luz. No almacene el producto cerca de alimentos, bebidas o piensos.

GESTIÓN DE ENVASES

Al final del tratamiento elimínese el cebo no consumido y el envase, como residuo peligroso de conformidad con la normativa vigente.

PRESENTACIÓN

Caja de cartón de 10 kg (a granel).

REGISTRO BIOCIDA

N.º Registro / Autorización biocida: ES/MR(NA)-2023-14-00891.