FICHA TÉCNICA

Quimicamp Higiene
su aliado en bioseguridad

GAMA DISQUIM

DESINFECTANTE 1510

Desinfectante líquido concentrado de amplio espectro y con acción terminal

Desinfección de contacto en superficies, ambientes, salas de incubación, vehículos, utensilios, y pequeño material en todo tipo de naves, locales e instalaciones del ámbito ganadero.

Bactericida - Fungicida - Viricida

COMPOSICIÓN
Glutaraldehído 15%, Cloruro de didecildimetilamonio 10%, Excipientes c.s.p. 100%

CATEGORÍA DE USUARIO
Autorizado para uso en el entorno ganadero. Uso exclusivo por personal especializado.

PRESENTACIÓN
Envases de 5 y 25 litros.

REGISTRO
Reg.Of.P.Zoosanitario: 01609-P

CARACTERÍSTICAS
DESINFECTANTE 1510 es un desinfectante concentrado con actividad bactericida, viricida y fungicida. Su efecto sinérgico se debe a la combinación de sus dos materias activas: el cloruro de didecildimetilamonio amonio cuaternario de 4ª generación con poder tensoactivo, que desinfecta y permite una mayor penetración del glutaraldehído, desinfectante de gran actividad y amplio espectro de acción. La combinación de ambos elimina un amplio rango de microorganismos, incluso aquellos que son difícilmente accesibles por estar protegidos por la suciedad, materia orgánica en descomposición o depósitos de grasa.

APLICACIONES
DESINFECTANTE 1510 es un desinfectante concentrado de amplio espectro eficaz frente a microorganismos como bacterias, virus y hongos. DESINFECTANTE 1510 posee las siguientes actividades de eficacia demostradas: Actividad bactericida frente a *Pseudomona aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae y Salmonella typhimorium*. Dilución 0,12%; Tiempo de contacto: 5 minutos. Actividad fungicida frente a *Candida albicans* y *Aspergillus niger*. Dilución 0,25%; Tiempo de contacto: 15 minutos. Actividad viricida bajo la norma UNE-EN 14675 para Enterovirus bovino tipo I, Influenza A aviar H1N1, Peste Porcina Africana). Dilución 1%; Tiempo de contacto: 30 minutos. Actividad viricida frente a Coronavirus 229E, Herpesvirus, Picornavirus (fiebre aftosa) a la dilución: 1%; Tiempo de contacto: 30 minutos.

DESINFECTANTE 1510 se emplea para la desinfección total de todo tipo de instalaciones de manera eficaz. DESINFECTANTE 1510 se recomienda para la desinfección de: -Superficies y equipos de instalaciones avícolas y ganaderas. -Salas y máquinas de los centros de incubación. -Vehículos de transporte, pediluvios, arcos de desinfección. -Material de trabajo, herramientas e instrumental. -Mesas, jaulas, equipos y superficies de trabajo de ámbito zoosanitario.

QUIMICAMP HIGIENE, S.L.
Ctra. de Logroño km.10,200 – 50180 Utebo (Zaragoza). Tel.: 976 786 464
info@quimicamphigiene.com - www.quimicamphigiene.com

FICHA TÉCNICA

Quimicamp Higiene
su aliado en bioseguridad

MODO DE EMPLEO

DESINFECTANTE 1510 puede ser aplicado, una vez diluido en agua, por: inmersión, baldeo, pulverización, nebulización y termonebulización. Antes de aplicar el producto, es recomendable la limpieza de la superficie donde se va a emplear el producto para una mejor acción de este.

Aplicar DESINFECTANTE 1510 directamente sobre la superficie a tratar. Aclarar los posibles restos de producto tras la desinfección de las superficies que vayan a estar en contacto con comida y/o bebida. Aplicar el tratamiento en ausencia de animales. Esperar un plazo de seguridad de 24 horas asegurando una óptima ventilación del recinto antes del realojo de los animales.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Actividad bactericida y fungicida:

Cumple la norma UNE-EN 13697, en condiciones sucias, a la temperatura de 18ºC ± 1ºC y 25ºC ± 1ºC, durante un tiempo de contacto de 5 minutos, frente a *Pseudomonas aeruginosa* CECT 116/ATCC 15442 (22,7ºC), *Staphylococcus aureus* ATCC 6538 (22,1ºC), *Enterococcus hirae* CECT 4081/ATCC 10541 (21,8ºC), *Escherichia Coli* CECT 216/ATCC 10536 (22,1ºC).

Cumple la norma UNE-EN 13697, en condiciones limpias, a la temperatura de 18ºC ± 1ºC y 25ºC ± 1ºC, durante un tiempo de contacto de 15 minutos, frente a *Aspergillus brasiliensis* ATCC 16404 (22,8ºC) y *Candida albicans* ATCC 10231 (21,4ºc y 22,3ºC).

Actividad viricida:

Cumple la Norma UNE-EN 14675, ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad viricida frente a Enterovirus bovino tipo 1 (ATCC VR-248), Influenza A aviar H1N1, Peste Porcina Africana). Dilución al 1% y con un tiempo de contacto de 30 minutos.

DOSIS Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Dosis: Se aplica diluido en agua a las siguientes dosis recomendadas:

-Desinfección rutinaria o general (pulverización): 0,30% (1:300).

-Desinfección en presencia de materia orgánica, pediluvios, arcos de desinfección: 0,50% (1:200).

-Desinfección tras brote infeccioso: 1,00% (1:100).

-Nebulización / Termonebulización: 10,00% (1:10), 1 litro de la disolución para tratar de 10 a 20 m²; 500 m³ (en nebulización) o 1000 m³ (en termonebulización).

Plazo de seguridad: 24 horas.

PRECAUCIONES

La dilución es incompatible con materia orgánica, detergentes aniónicos, derivados amoniacales e hipocloritos. Incompatible con cromo, plomo, aluminio, estaño, cinc y sus aleaciones (bronce, latón, etc.). Incompatible con productos básicos, clorados y tensioactivos aniónicos. Evitar trabajar en la nube de pulverización, si no es mediante el uso de mascarillas y protección apropiadas para tal efecto somo se describe en la ficha de datos de seguridad.

GESTIÓN DE ENVASES

Los envases vacíos, resto de producto, agua de lavado, contenedores y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Entréguense dichos residuos a un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente.

ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO

A partir de los 3 años de la fecha de fabricación, el producto puede ir reduciendo paulatinamente su efectividad. Conservar en un lugar fresco y seco.

QUIMICAMP HIGIENE, S.L.
Ctra. de Logroño km.10,200 – 50180 Utebo (Zaragoza). Tel.: 976 786 464
info@quimicamphigiene.com - www.quimicamphigiene.com